

SOINS DE TRACHEOTOMIE

Percutanée ou chirurgicale récente ou orifice infecté.

CHRA Réanimation polyvalente	Classeur Pratique de soins infirmiers	7900-protocole trachéo sale version 2	
		21/04/2010	Page 1/3

Rédaction : Ph. BECHET.	Vérification : D. DOREZ.	Approbation : D. DOREZ
-------------------------	--------------------------	------------------------

1 BUT

Soin sur trachéotomie percutanée ou chirurgicale récente (présence de points) ou Orifice infecté.

2 DOMAINE D'APPLICATION

Service de réanimation polyvalente, personnels infirmiers.

3 FREQUENCE

Soins toutes les **24 heures** en suivant la toilette.

4 MATERIELS UTILISES

4.1 Matériel stérile

Set à pansement stérile avec pinces.

4.2 Matériel non stérile

Pour le soin :

- 1 masque de soin / soignant, 1 charlotte / soignant,
- 1 sur-blouse propre
- 1 chariot de soins, 2 étages, (préalablement désinfecté)
- 1 METALLINE®,
- 1 lanière trachéo,
- 1 savon (BETADINE SCRUB®), (HIBISCRUB si allergie à l'IODE),
- 1 ampoule sérum physiologique,
- 1 solution antiseptique
(BETADINE DERMIQUE ou ORL®),
- 1 haricot,

SOINS DE TRACHEOTOMIE

Percutanée ou chirurgicale récente ou orifice infecté.

CHRA Réanimation polyvalente	Classeur Pratique de soins infirmiers	7900-protocole trachéo sale version 2	
		21/04/2010	Page 2/3

1 paire de gant non stériles,
1 vaporisateur détergent-désinfectant.

dans la chambre :

1 bac de décontamination,
1 solution antiseptique (ALKAZYME®),
1 écouvillon,

Un écarteur de trachéotomie ou une bougie en emballage, ***toujours présent dans la chambre,***

1 sachet pour le stockage des canules , canules internes décontaminées et valve de phonation en attente.

5 PREPARATION DU SOINS

mettre masque, charlotte et tablier
lavage de mains antiseptique,
préparer le plateau de soin, avec installation du champs, des compresses et des pinces sur le chariot,
préparer le savon, le sérum physiologique et la solution antiseptique dans l'emballage plastique du set,
préparer le haricot sur la partie inférieure du chariot.

6 LE SOINS

mettre des gants non stériles pour retirer la METALLINE® ancienne et desserrer la lanière.

lavage de mains antiseptique.

à l'aide des pinces :

nettoyer l'orifice avec le savon,
rincer avec le sérum physiologique,
sécher,
appliquer la solution antiseptique,
si besoin, changer la mèche iodoformée.

SOINS DE TRACHEOTOMIE

Percutanée ou chirurgicale récente ou orifice infecté.

CHRA Réanimation polyvalente	Classeur Pratique de soins infirmiers	7900-protocole trachéo sale version 2	
		21/04/2010	Page 3/3

faire maintenir la canule de trachéotomie si le patient tousse ou risque de bouger par un(e) aide portant masque, charlotte et sur-blouse propre.

mettre la METALLINE®,
changer la lanière.

ranger et nettoyer le matériel.

noter le soin sur la feuille de pansement “ soin de trachéotomie ”.

7 MOTS CLES

- Trachéotomie
- Trachéo
- Canule

Diffusion pour application	Réanimation, USC
----------------------------	------------------

Rédaction	IDE Ph BECHET	
Vérification	Dr D. DOREZ	
Approbation	Dr D. DOREZ	

Historique des création et modifications successives du document			
Version	date	nature des modifications	page
1	28 fév. 2003	1 ^{ère} version	3
2	24/01/2008	actualisation	3